

A類疾病に対する予防接種

対象疾病	ワクチン	対象者	標準的な接種期間	回数	間隔	備考
ジフテリア 百日せき 破傷風 急性灰白 髄炎 (ポリオ)	DPT-IPV(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合ワクチン)又はDPT(百日咳・ジフテリア・破傷風混合ワクチン)又はDT(ジフテリア・破傷風混合ワクチン)又はIPV(不活化ポリオワクチン) DT(ジフテリア・破傷風混合ワクチン)	1期初回	生後3月から生後90月に至るまでの間にある者	生後3月に達した時から生後12月に達するまでの期間	3回	20日以上
		1期追加	生後3月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおく)	1期初回接種(3回)終了後12月に達した時から18月に達するまでの期間	1回	1期初回接種(3回)終了後、6月以上
		2期	11歳以上13歳未満の者	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	1回	—
結核	BCG	生後1年に至るまでの間にある者	生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間	1回	—	
麻疹 (はしか) 風しん	MR(麻疹・風しん混合ワクチン)又は単独	1期	生後12月から生後24月に至るまでの間にある者		1回	—
		2期	5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日、までの間にある者		1回	—
日本脳炎		1期初回	生後6月から生後90月に至るまでの間にある者	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間	2回	6日以上
		1期追加	生後6月から生後90月に至るまでの間にある者(1期初回終了後おおむね1年おく)	4歳に達した時から5歳に達するまでに期間	1回	1期初回接種終了後、6月以上
		2期	9歳以上13歳未満の者	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	1回	
Hib感染症		生後2月以上生後60月に至るまで	初回接種開始は生後2月～生後7月に至るまで	開始が生後2月～7月に至るまでの場合 開始が生後7月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合	初回3回追加1回 初回2回追加1回	初回: 27日(医師が認める場合は20日)～56日追加: 初回終了後7月以上
				開始が生後12月に至った日の翌日～生後60月に至るまでの場合	1回	
小児の肺炎球菌感染症		生後2月以上生後60月に至るまで	初回接種開始は、生後2月～生後7月に至るまで	開始が生後2月～生後7月に至るまでの場合	初回3回(生後12月までに完了)追加1回	初回: 27日以上追加: 初回の3回目から60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降
			追加接種は、生後12月～15月に至るまで	開始が生後7月に至った日の翌日～生後12月に至るまでの場合	初回2回(生後13月までに完了)追加1回	
				開始が生後12月に至った日の翌日～生後24月に至るまでの場合	2回	60日以上
				開始が生後24月に至った日の翌日～生後60月に至るまでの場合	1回	—
ヒトパピローウイルス感染症(子宮頸がん予防)	組換え沈降2価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン	小6～高1相当の女子	中1の間 2回目: 1回目の接種から1月 3回目: 1回目の接種から6月	3回	2回目: 1回目の接種から1月～2月半 3回目: 1回目の接種から5～12月	2つのワクチンの互換性に関する安全性・有効性等のデータが存在しないため、同一のワクチンを3回続けて接種する。
	組換え沈降4価ヒトパピローウイルス様粒子ワクチン		中1の間 2回目: 1回目の接種から2月 3回目: 1回目の接種から6月			
水痘		生後12月～生後36月に至るまでの間にある者	生後12月から生後15月に至るまで	2回	3月以上(標準的には6月～12月未満)	